

## ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ДО КТ-ОБСТЕЖЕННЯ

Пацієнти потребують спеціальної підготовки при РКТ-обстеженні органів черевної порожнини та органів тазу.

1) Обстеження проводиться не раніше, ніж на 7-10 добу після рентгено-логічного дослідження із застосуванням барію.

2) Обстеження проводиться суворо натщесерце при дослідженні печінки, жовчного міхура. При обстеженні підшлункової залози в другій половині дня дозволяється вранці легкий сніданок. В інших випадках — легке харчування, виключення з дієти продуктів, що викликають підвищене газоутворення в кишечнику. Напередодні ввечері проводиться очисна клізма.

### **Підготовка проводиться:**

напередодні — медичним персоналом стаціонару, в якому лікується пацієнт, чи самим пацієнтом при амбулаторному обстеженні;

в день обстеження — у відділенні променевої діагностики Центру.

Для обстеження хворий повинен мати при собі одну ампулу (20 мл) 60-75 % водорозчинної йодовмісної контрастуючої речовини (верографін, урографін, кардіотраст, тріомбраст).

При обстеженні органів черевної порожнини та органів тазу необхідно проводити маркування кишечника за певний час до обстеження (в медичному закладі, який направляє хворого на обстеження). Для маркування кишечника використовується 3-4 % розчин йодовмісної контрастуючої речовини (верографін, урографін).

Приготування розчину: 76 % розчин верографіну — 20,0 мл розводиться 700 мл кип'яченої води.

Цей розчин приймається per os:

При обстеженні підшлункової залози

- по 700,0 мл за 10 -16 та 2,5 - 3 години до обстеження.

При обстеженні заочеревинного простору

- по 700,0 мл за 10 -16 годин до обстеження.

При обстеженні печінки

- по 700,0 мл за 2 - 2,5 години до обстеження.

Для маркування тонкої кишки

- по 700,0 мл за 2 - 2,5 години до обстеження.

Для маркування клубової кишки

- по 700,0 мл за 8 годин та 2 години до обстеження.

Для маркування вихідного відділу товстої кишки

- по 700,0 мл за 6-8 годин до обстеження.

При обстеженні органів тазу

- по 600,0 мл за 10- 16 та за 2,5 - 3 години до обстеження.

За 1 годину до обстеження не дозволяється випорожнення сечового міхура.