

Фактори ризику

- Похилий вік (75% хворих старше 50 років)
- Наявність фонових і передпухлинних захворювань вульви: дистрофій вульви, VIN
- Пізні менархе і рання менопауза в анамнезі
- Хірургічна кастрація
- Супутні нейроендокринні захворювання: ожиріння, захворювання печінки, щитовидної залози, дієнцэфальний синдром та інші
- Вірусне інфікування високоонкогенними штамми ВПЛ (вірус папіломи людини)
- Низький соціально-економічний статус
- Захворюваність залежить також від географічних умов проживання, від особливостей способу життя компактно проживаючих ендемічних груп, расової приналежності.

Причини виникнення :

Середній вік хворих до моменту виявлення захворювання – 68 років.

В етіопатогенезі даного захворювання провідну роль відводять хронічному запаленню на фоні дефіциту гормонів і змін рецепторних реакцій, пов'язаних з віком.

В 40-75% випадків рак вульви розвивається на фоні дистрофічних захворювань вульви.

Розрізняють наступні клінічні варіанти протікання захворювання:

- Захворювання, що виникає переважно у жінок репродуктивного віку, індуковане вірусом папіломи людини (рідкий варіант);
- Захворювання, що виникає у жінок в період менопаузи на фоні нейроендокринних порушень, хронічного запалення.