

Причини виникнення :

Доказані етіологічні фактори для міхурцевого занесу:

- вік матері (в віці старше 40 років – ризик захворюваності вище в 7,5 разів);
- міхурцевий занесок в анамнезі

Ймовірні етіологічні фактори:

- порушення імунного статусу у жінок з великою кількістю вагітностей і коротким інтервалом між ними;
- дефіцит тваринних жирів і жиророзчинних вітамінів (особливо вітамін А);
- куріння
- дія іонізуючого випромінення
- дія гербіцидів

Клініка :

Міхурцевий занесок:

- 1) затримка місячних
- 2) біль внизу живота ниючого або переймоподібного характеру
- 3) швидкий ріст матки (частіше випереджає темпи розвитку, характерні для фізіологічного протікання вагітності)
- 1) симптоми раннього і пізнього гестозу
- 2) утворення кист яєчників більше 6 см в діаметрі (48-52% випадків)
- 3) маткові кровотечі різної інтенсивності (більше 90%)
- 4) внутрішньочеревна кровотеча внаслідок перфорації матки пухлиною (при інвазивному МЗ)

Можливі ускладнення:

- неперервна блювота вагітних (20-30%)
- артеріальна гіпертензія, преєклампсія (10-30%)
- симптоми гіпертериозу (2-7%)
- розрив кист яєчників, перекути ніжки кисти (3%)
- емболія гілок легеневої артерії через 4 години після евакуації МЗ (2-3%)
- ДВЗ-синдром